

Зовнішня характеристика ясен

Займаючись реконструкцією зубів і зубних рядів, прагнучи отримати красивий і функціональний результат, лікар і зубний технік повинні добре уявляти естетичні параметри ротової порожнини і посмішки. Помилково вважати, що естетика ротової порожнини обмежується формою і кольоровими характеристиками зубів. Для повноцінного сприйняття і естетичного аналізу ситуації потрібне уважне ставлення до стану як твердих, так і м'яких тканин. У момент розмови, прояву емоцій нижня третина обличчя завдяки рухливості м'язів і нижньої щелепи негайно привертає увагу співрозмовника. Тому, коли ми закінчуємо лікування пацієнта, для нас важлива інтеграція реставрації не лише в ротову порожнину, але і в посмішку, обличчя пацієнта і в організм у цілому. Тому треба звертати увагу на особливості вигляду ясен.

Здорові м'які тканини повинні мати наступні характеристики:
А. Вільні (крайові) ясна простягаються від вільного ясенного краю (коронально) до ясенної борозни (апикально) і мають матову коралово-рожеву поверхню. Називається вільними вони через те, що не мають епітеліального прикріплення до твердих тканин (мал. 1).



Мал. 1. Ділянка ясен, що не має прикріплення до твердих тканин зуба

Б. Прикріплені ясна простягаються від ясенної борозни (коронально) до перехідної складки ясен (слизово-ясенного з'єд-

нання), вони мають коралово-рожевий колір і щільну структуру поверхні (кератинизована і прикріплена до альвеолярного відростка), при цьому в 30-40 % дорослих вона має вид апельсинової кірки (мал. 2).



Мал. 2. Ділянка ясен, що прикріплена до альвеолярного відростка

В. Слизова оболонка альвеолярного відростка розташовується апікально від перехідної складки ясен, не прикріплена (рухома) і має темно-червоне забарвлення (мал. 3).



Мал. 3. Ділянка рухомих ясен, що йде від альвеолярного відростка до перехідної складки

При виготовленні різних видів ортопедичних, терапевтичних і ортодонтичних конструкцій необхідно дбайливо ставитися до стану зубів і ясен. При травматичному препаруванні виникає безповоротна деструкція твердих тканин і погіршується стан м'яких. Тоді як при акуратній роботі, навіть у безпосередній близькості, травмування ясен можна уникнути (мал. 4).



Мал. 4. Акуратне препарування твердих тканин, відсутність травми ясен

Крім того, при неточному краю реставрації виникає стійкий запальний процес в яснах, руйнується їх прикріплення до поверхні кореня зуба (мал. 5).



Мал. 5. Запальний процес в ділянці 21 зуба внаслідок неточного краю реставрації

Забезпечуючи максимально точне прилягання реставрації, з відновленням відповідної анатомії, можна спостерігати відсутність запалення і здоровий вигляд ясен (мал. 6).



Мал. 6. Відсутність запалення ясен в ділянці передньої групи зубів, вкритих адгезивними керамічними реставраціями

Автор: К. Д. Чавушьян, стоматолог-ортопед