

Межі базисів повних пластинкових протезів

Після відливання гіпсових моделей за отриманими з клініки анатомічними відбитками визначають та окреслюють на моделях межі майбутніх базисів повних пластинкових протезів.



*Модель верхньої
беззубої щелепи*



*Модель нижньої
беззубої щелепи*

Межі базису повного пластинкового протеза на верхню щелепу

З вестибулярного боку межа доходить до активно-рухомої зони слизової оболонки. У фронтальній ділянці край протеза обходить вуздечку верхньої губи, а в бічних ділянках огинає щічні складки (тяжі) слизової оболонки, щоб вони в майбутньому не травмувалися краєм протеза, а сам базис не зміщувався з протезного ложа. У задньому відділі базис повинен перекривати ще й верхньощелепні горби. Від горбів межа базису проходить по ділянці переходу твердого піднебіння в м'яке, тобто по нейтральній зоні в місці прикріплення м'язів м'якого піднебіння, заходячи за лінію А на 1-3 мм.



*Окреслена
модель верхньої
беззубої щелепи.
Також додат-
ково позначені
середина альвео-
лярного гребеня
та верхньоще-
лепні горби*

Межі базису повного пластинкового протеза на нижню щелепу

З вестибулярного боку базис доходить до активно-рухомої зони слизової оболонки, обходить вуздечку нижньої губи, а в ділянці премолярів – місця прикріплення бічних тяжів слизової оболонки. Потім перекриває нижньощелепні горби, переходить на язичну поверхню, обов'язково перекриваючи щелепно-під'язикові лінії правого та лівого боку, доходячи у фронтальному відділі до місця прикріплення вуздечки язика обов'язково обходячи її.



*Окреслена
модель нижньої
беззубої щелепи.
Також додат-
ково позначені
середина альвео-
лярного гребеня
та нижньоще-
лепні горби*

Недотримання визначених меж призводить до травмування слизової оболонки протезного ложа, необхідності багатьох корекцій, продовження терміну адаптації хворих до повних знімних пластинкових протезів.